

Роспотребнадзор информирует!

О ситуации по обращаемости населения с укусами клещами и мерах профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами

По данным эпидемиологического мониторинга с укусами клещами среди населения Парфеньевского муниципального округа по состоянию на 19.06.2023года обратилось 182 человека, из них 37 детей, что на 176% больше в сравнении с 2022годом. Среди населения зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита, что в 2022году не регистрировалось и 2 сл. клещевого боррелиоза, что так же в 2022году не регистрировалось. Специфическую профилактику (сделали прививку) в 2023году получили 268 человек, против 296 – в 2022году (- 9%).

ТО Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе вновь напоминает о повышенной активности клещей в этом году и соблюдению неспецифических мер профилактики, включающих следующие мероприятия:

- Применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
- Использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
- Для защиты от клещей необходимо для отдыха на природе выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы, не располагаться в затененных местах с высокой травой.
- Каждый человек, находясь на природе в сезон активности клещей, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, особенно обращать внимание на швы и воротник, где могут спрятаться клещи. Осматривать домашних животных каждый раз после прогулок на природе или после пребывания на придомовой территории.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща принять немедленно меры по его удалению.

Удаление присосавшегося клеща лучше проводить в медицинской организации: в поликлинике по месту жительства, в приемном покое больницы, в травматологическом пункте, в амбулатории, в фельдшерском пункте.

Если самостоятельно проводить удаление клеща, то снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:


- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
- если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию медицинской организации.

Уважаемые жители! Будьте здоровы.

Начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Костромской области в
Галичском районе



А.М.Волкова