

# ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОСТРОМЫ И ОБЛАСТИ



23 апреля 2026 года  
с 15:00-17:00

на Ваши вопросы по теме:  
«Вакцинация и здоровье детей»  
ответит:

Харитоновна Галина Юрьевна  
заместитель главного врача  
по клинко-экспертной работе  
ОГБУЗ «Городская больница  
г. Костромы», главный внештатный  
специалист педиатр департамента  
здравоохранения Костромской области

8-800-450-03-03

# ВРЕМЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

**3-7**  
ДЕНЬ

**ТУБЕРКУЛЕЗ**

**1**  
МЕСЯЦ

**ВИРУСНЫЙ ГЕПЕТИТ**

**4.5**  
МЕСЯЦ

**ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ,  
СТОЛБНЯК**

**ПОЛИОМИЕЛИТ**

**ГЕМОФИЛЬНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ**

**ПНЕВМОКОККОВАЯ  
ИНФЕКЦИЯ**

**6**  
МЕСЯЦ

**ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ,  
СТОЛБНЯК**

**ВИРУСНЫЙ ГЕПЕТИТ**

**ПОЛИОМИЕЛИТ**

**ГЕМОФИЛЬНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ**

**15**  
МЕСЯЦ

**ПНЕВМОКОККОВАЯ  
ИНФЕКЦИЯ**

**18**  
МЕСЯЦ

**ПОЛИОМИЕЛИТ  
ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ,  
СТОЛБНЯК**

**РОТИТ**

# ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ



# ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ?



Вакцинопрофилактика - самое эффективное средство предотвращения инфекционных заболеваний у детей.



защищает вашего ребенка от смертельных заболеваний



не допускает вспышку предотвратимых заболеваний



экономит деньги и время

**В нашей стране все дети должны быть привиты против:**

- туберкулеза
- вирусного гепатита В
- дифтерии
- коклюша
- столбняка
- полиомиелита



- кори
- гриппа
- краснухи
- пневмококковой инфекции
- гемофильной инфекции
- эпидемического паротита

Также, рекомендована вакцинация против ротавирусной инфекции

В странах где вакцины против ротавируса были введены в национальный календарь иммунизации детей, смертность от всех заболеваний связанных с диареей снизилась в среднем на 42%.



# МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



Менингококковая инфекция - опасная для жизни, часто молниеносная инфекция, вызываемая менингококком (*Neisseria meningitidis*)

Симптомы зависят от формы инфекции:



**менингококковый назофарингит:**  
лихорадка, слабость, головная боль, насморк



**менингококковый сепсис:**  
лихорадка, головная боль, бледность кожи, рвота, сыпь на коже, похожая на кровоизлияния



**менингококковый менингит:**  
сильнейшая головная боль, светобоязнь, тошнота, повторная рвота, напряженность мышц шеи



Источники инфекции:

- больной человек
- носитель

Как передается

воздушно-капельно при тесном контакте, когда расстояние между людьми составляет менее 1 метра

Менингококки неустойчивы во внешней среде, быстро погибает при перепадах температуры и влажности, воздействии ультрафиолета и дезинфицирующих средств

Лучшая защита от менингококковой инфекции - вакцинация!



Схема вакцинации:

Детям с 9 до 23 месяцев - 2 введения вакцины с интервалом не менее 3 месяцев  
Детям с 2-х лет и взрослым - 1 введение



Вакцинация против менингококковой инфекции проводится в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок